



Vähimmäistietosisältö

Hyvinvoinnin tila


Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä




Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet (%)




Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15-64 vuotiaista




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat (%)




Yksinasuvat 75-vuotta täyttäneet (%)




Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa (%)




Ylipaino, % 8.- ja 9.-luokkalaisista




Ei syö koululounasta päivittäin, % 8.- ja 9.-luokkalaisista




Lihavien osuus koulutusryhmittäin 20 vuotta täyttäneistä 2022 (%)




Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä



Lihavuuden yleisyys (%)



Terveysliikuntasuositusten mukaan liian vähän liikkuvien osuus 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin 2022 (%)




Elintavat - Päihteet


Lähde: Sotkanet.fi, Tilasto- ja indikaattoripankki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta (%)


8. ja 9. luokan oppilaat



Käyttänyt jotain tupakkatuotetta /sähkösavuketta vähintään kerran, % 4. ja 5. luokan oppilaista




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) 20 vuotta täyttäneistä 2022 (%)




Ammattilisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaat




Päivittäin tupakoivien osuus koulutusryhmittäin 2022 (%)



Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaat




Menetetty elinvuodet (PYLL), alkoholikuolemat - pienituloiset - ikävälillä 25-80 v / 100 000 vastaavan ikäistä




Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevat


4. ja 5. luokan oppilaat




Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden oppilaat




8. ja 9. luokan oppilaat




Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaat



Terveytensä keskitasoisiksi tai huonoksi kokevat 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin 2022




Todettuja klamydiainfektioita / 100 000




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus


8. ja 9. luokan oppilaat




Ammattilisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaat




Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaat




Mielenterveyden ja käyttäytymisen vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18-34-vuotiaat (%)




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) 2022




Itsensä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus 75 vuotta täyttäneistä (%)




100 matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia 20-64-vuotiaissa (%)



500 matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus 65 vuotta täyttäneistä (%) 2020




Apua riittämättömästi saavien osuus 75 vuotta täyttäneistä (%)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä (%)


4. ja 5. luokan oppilaat




Ammattilisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaat




8. ja 9. luokan oppilaat




Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaat




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei varusmiespalveluksessa) olevat 18-24 vuotiaat (%)



Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus 20 vuotta täyttäneistä (%)



Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus 20-64-vuotiaista (%) 2020




Tapaturmat ja väkivalta


Lähde: Sotkanet.fi, Tilasto- ja indikaattoripankki, Terveystieteiden tutkimuskeskus ja hyvinvoinnin laitos

Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana


4. ja 5. luokan oppilaat




Ammattilisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaat




8. ja 9. luokan oppilaat




Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaat



Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus 20 vuotta täyttäneistä (%)



Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä (%)



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 vastaavan ikäistä

